



## WAŻNE INFORMACJE

- Konieczna wcześniejsza rejestracja w celu ustalenia terminu badania
- Na badanie należy pojawić się z dowodem osobistym
- Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza
- Badanie trwa do 30 min
- Nie należy jeść 6 godzin przed badaniem
- Nie należy pić 3 godziny przed badaniem
- Osoby przyjmujące leki powinny je zażywać jak zwykle
- Należy dostarczyć wcześniejsze wyniki badań (TK, MR, RTG, USG)
- **W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań**

## PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA

### Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające badania:

- Cięża

### Przeciwwskazania do badania z użyciem środków kontrastowych:

- Uczulenie na jod
- Wole toksyczne tarczycy
- Planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem
- Nadczynność tarczycy
- Niewydolność nerek
- Nadciśnienie
- Ostra i przewlekła niewydolność krążenia
- Astma i rozedma płuc
- Ostry krwotok śródmózgowy